



Ambulatori per la vaccinazione pediatrica

Zona Aretina

Arezzo: *viale Cittadini 33 - tel. 0575 254851*
Subbiano: *via Matteotti 27 - tel. 0575 255881*
Monte San Savino: *via della Pace 1*
tel. 0575 255909
Badia Al Pino: *via Pratomagno 2*
tel. 0575 254899

Zona Valdichiana

Camucia: *via Capitini, 6*
tel. 0575 639875 mar e giov 12-13
Castiglion Fiorentino: *Casa della salute*
tel. 0575 639880 mar e ven 12-13
Foiano: *viale Umberto I*
tel. 0575 639908 dal lun al ven 10-12

Zona Valtiberina

Sansepolcro: *via Santi di Tito 24*
tel. 0575 757866 tel. e fax 0575 757869

Zona Valdarno

Bucine: *tel. 055 9106013*
Montevarchi: *tel. 055 9106721*
San Giovanni V.no: *tel. 055 9106415*
Terranuova: *tel. 055 9106834*

Zona Casentino

Poliambulatorio
via Colombaia Bibbiena Stazione
Ufficio vaccinazioni tel. 0575 568321

in collaborazione con
U.O.S Comunicazione e Marketing
Azienda Us18 Arezzo

Dipartimento di Prevenzione
U.O. Igiene e Sanità pubblica
U.O. Attività Sanitarie di Comunità



Campagna di vaccinazione
contro le **malattie infantili**
per la prevenzione
del **rotavirus**



La malattia

Il **Rotavirus** è un virus altamente contagioso che può causare gravi diarree dalla durata di 3 o 8 giorni, solitamente accompagnate da vomito e febbre (gastroenterite acuta).

Il virus circola spesso tra **novembre e marzo**, soprattutto tra i bambini che frequentano l'asilo nido o la scuola materna. Questa fascia di età è più soggetta ad ammalarsi perché il contagio avviene per via orofecale, cioè quando i bambini portano alla bocca le mani contaminate dal virus presente nell'ambiente. Il periodo di incubazione è di circa 2 giorni, dopodiché si manifesta la malattia, che può avere un decorso particolarmente grave sotto i due anni di vita, ponendo il piccolo a rischio di disidratazione tale che, in rarissimi casi, può essere addirittura mortale. La terapia si basa sulla reidratazione con apposite soluzioni da somministrare per bocca o per via endovenosa. Frequentemente tale forma infettiva richiede l'ospedalizzazione.

La vaccinazione

La vaccinazione richiede la somministrazione per bocca di due dosi a distanza di almeno 4 settimane. La prima dose può essere somministrata dalla 6^a settimana di vita.

Il ciclo vaccinale dovrebbe essere effettuato entro la 16^a settimana di vita, in ogni caso entro le 24 settimane.

Dopo due dosi di vaccino, l'efficacia protettiva durante il primo anno di vita è del 90% contro la gastroenterite grave e del 73% contro qualsiasi gastroenterite da rotavirus. L'efficacia protettiva della vaccinazione durante il secondo anno di vita è del 83% contro la gastroenterite grave e del 73% contro qualsiasi gastroenterite da rotavirus.

L'Azienda Usl 8 offre la vaccinazione ai nuovi nati, in copagamento.

Quali soggetti non vaccinare

Controindicazioni temporanee

In caso di infezione acuta febbrile o in presenza di vomito e/o diarrea la vaccinazione va rimandata.

Controindicazioni permanenti

Non devono essere vaccinati i bambini che hanno sofferto di invaginazione intestinale o quelli affetti da malattia gastro-intestinale cronica, immunodeficienza o allergia a uno dei componenti del vaccino.

Possibili effetti collaterali

Come tutti i vaccini, anche quello contro il Rotavirus può provocare reazioni indesiderate. Dopo la vaccinazione si possono verificare: vomito, diarrea, febbre, irritabilità, perdita di appetito e di sonno.

Alcuni studi clinici hanno dimostrato un lieve incremento dei casi di invaginazione intestinale entro una settimana dalla somministrazione della prima dose di vaccino. Il rischio stimato è di un aumento fino a 6 casi ogni 100.000 bambini.

L'invaginazione intestinale è una forma di blocco intestinale che deve essere trattato in ospedale e che a volte richiede un intervento chirurgico. Durante la prima settimana, soprattutto dopo la prima dose di vaccino, è necessario valutare attentamente eventuali segni e sintomi insoliti come febbre alta, debolezza o irritabilità, dolore addominale, pianto inconsolabile, episodi di vomito ripetuto o presenza di sangue nelle feci. In questi casi rivolgersi rapidamente al proprio pediatra o al Pronto Soccorso.

Altre informazioni

Non è necessario il digiuno prima della vaccinazione e il bambino può mangiare anche subito dopo la somministrazione. Poiché il virus vaccino viene eliminato con le feci, è buona norma che chiunque accudisca il bambino nei 15 giorni successivi alla vaccinazione si lavi accuratamente le mani dopo aver cambiato il pannolino e prima di mangiare e preparare il cibo.