

MENINGOCOCCO

alcune informazioni per i genitori

Le **meningiti e le sepsi batteriche** sono malattie gravi che possono determinare lesioni permanenti (danni neurologici o sensoriali, amputazioni di arti, etc) o anche portare alla morte.

Attualmente sono disponibili vaccini contro le forme provocate da 13 ceppi di **pneumococco**, da emofilo (*Haemophilus influenzae* tipo b o **HIB**, contenuto nel vaccino esavalente), e da diversi tipi di **meningococco**.

Il **meningococco** è un batterio di cui si conoscono diversi tipi, in particolare A, B, C, W135 e Y: in Italia e in Europa i più diffusi sono attualmente il B e il C, mentre gli altri tipi sono più diffusi negli altri continenti. A seguito dell'introduzione della vaccinazione contro il meningococco C, attualmente la maggior parte delle meningiti e sepsi da meningococco in Italia sono provocate dal tipo B.

Il meningococco può essere responsabile di infezioni di varia gravità e colpire soggetti di tutte le età, ma soprattutto i bambini e i giovani adulti. Si possono anche registrare episodi epidemici, soprattutto in comunità di bambini e giovani adulti.

I vaccini

> Vaccino contro **meningococco C**: inserito nel calendario delle vaccinazioni raccomandate, viene offerto gratuitamente in unica dose ai bambini di 14-15 mesi e agli adolescenti.

> Vaccino **quadrivalente ACWY**: completa la protezione anche contro tipi meno diffusi in Italia ma frequenti in altre aree geografiche come Africa, Asia, America. Raccomandato per i viaggiatori e per tutti coloro che desiderino una protezione più completa. Disponibile previo pagamento di ticket. È possibile effettuare questa vaccinazione al 14°-15° mese di vita, al posto del solo vaccino contro il Meningococco C, previo pagamento di un ticket ridotto.

> Vaccino contro il **meningococco B**: è offerto gratuitamente ai nati a partire dal 1 gennaio 2014, ma può essere eseguito previo pagamento di ticket a qualsiasi età. Il calendario varia seconda dell'età: 4 dosi se si inizia entro il sesto mese di vita; 3 dosi in caso di inizio tra i sei mesi e i due anni; due dosi nelle fasce di età superiori.

Tutti i vaccini sopra indicati sono inoltre offerti gratuitamente e raccomandati per i soggetti affetti dalle patologie a rischio indicate nel calendario regionale.

Controindicazioni alla vaccinazione sono rappresentate da reazione allergica grave (anafilassi) dopo la somministrazione ad una precedente dose di vaccino o ad un suo componente. E' opportuno rimandare la vaccinazione in presenza di malattie acute febbrili o disturbi generali giudicati importanti dal medico.

Effetti collaterali

La vaccinazione è in genere ben tollerata. Le reazioni nella sede dell'iniezione compaiono entro 24 – 48 ore e possono essere consistere in arrossamento, gonfiore, dolore. Può comparire la febbre. Reazioni allergiche gravi sono eccezionali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio Pediatra di Famiglia, oppure ai centri vaccinali della ASL 11, oppure consultare il sito www.vaccinarsi.org