

Dopo la vaccinazione il bambino può manifestare qualche transitorio comportamento insolito.

Cerchiamo di rispondere alle domande più frequenti che si pongono i genitori su cosa fare se il piccolo presenta disturbi.

Il mio bambino è irrequieto. Cosa devo fare?

Dopo la vaccinazione i bambini possono essere particolarmente irrequieti o piangere in modo inconsolabile, poiché possono sentire dolore nella sede di iniezione e/o avere la febbre.

Si può somministrare un farmaco: il paracetamolo, secondo il peso del bambino (vedi tabella), che aiuta a ridurre il dolore e la febbre; tale sostanza si trova in commercio con il nome di Tachipirina, Efferalgan, ecc.

Se lo stato di irrequietezza persiste, nonostante il farmaco, per più di 24 ore consultate il pediatra o il centro vaccinale.

La sede di iniezione è calda ed arrossata. Cosa devo fare?

Applicare un panno intriso di acqua fredda, ben strizzato, sulla zona arrossata. Se ritenete che il bambino abbia dolore poiché reagisce alla minima pressione, potete somministrare il paracetamolo secondo il peso del bambino. La zona di inoculazione non va mai massaggiata.

Penso che il bambino abbia la febbre. Cosa devo fare?

Prima di tutto verificare se l'impressione è corretta misurando la temperatura corporea.

Se il bambino ha la febbre:

- dategli da bere in abbondanza
- vestitelo in modo leggero senza coprirlo eccessivamente
- somministrare paracetamolo (vedi tabella)

Se il bambino continua ad avere la febbre per oltre 24 ore, se la febbre aumenta molto o il bambino presenta sintomi insoliti, consultare il medico.

Dosaggi di paracetamolo

	3,2 - 6 Kg	7 - 10 Kg	11 -12 Kg	13-20 Kg
Gocce	16 – 23 gocce ogni 6 ore	40 – 46 gocce ogni 6 ore	40 – 46 gocce ogni 4 ore	
Sciroppo		5 ml ogni 6 ore	5 ml o gni 6 ore	7,5/10 ml ogni 6 ore
Supposta mg 125	1 supposta ogni 6 ore	1 supposta ogni 4-6 ore	1 supposta ogni 4 ore	
Supposta mg 250			1 supposta ogni 8 ore	1 supposta ogni 6 ore