

## **Vaccinazione antivaricella**

La **varicella** è una malattia molto contagiosa che si manifesta con febbre, eruzione cutanea di tipo vescicoloso, prurito. Possibili, ma rare complicanze sono: interessamento del sistema nervoso centrale (nevrite), renale (glomerulonefrite), polmonite; quest'ultima può essere particolarmente grave nell'adulto e nella donna in gravidanza. La varicella può causare malformazioni fetali se contratta durante la gravidanza.

Per una corretta immunizzazione si somministrano due dosi di vaccino a distanza di almeno un mese l'una dall'altra.

**La vaccinazione anti- varicella è fortemente raccomandata e gratuita.**

## **Possibili effetti indesiderati conseguenti alle vaccinazioni**

Gli effetti collaterali dei vaccini sono modesti e possono consistere in arrossamento, dolore e tumefazione nel sito di iniezione; può manifestarsi febbre, eruzione cutanea, sonnolenza, irritabilità, diarrea, vomito. Del tutto eccezionalmente sono riportati in letteratura, effetti collaterali gravi di tipo neurologico con esiti invalidanti.

Per completezza informativa vengono sotto riportati gli effetti indesiderati dei vaccini proposti come da scheda tecnica.

### **Effetti indesiderati:**

**molto comune** ( $\geq 1/10$ ): febbre

**comune** ( $\geq 1/100$ ,  $< 1/10$ ): dolore, gonfiore, eritema al sito di iniezione, rash tipo varicella, infezioni vie respiratorie superiori.

**non comune** ( $\geq 1/1.000$ ,  $< 1/100$ ): cefalea, tosse congestione nasale, diarrea, vomito, malessere,

**raro** ( $\geq 1/10.000$ ,  $< 1/1.000$ ): rash tipo orticaria, dolori muscoloscheletrici, linfadenopatia, trombocitopenia.

Altri eventi riportati: anafilassi, polmoniti, convulsioni febbrili e non, sindrome di Guillain Barré, encefaliti.

Coloro che ricevono il vaccino devono evitare l'uso di salicilati (es. Aspirina) per le 6 settimane successive alla vaccinazione.

Come tutti i farmaci anche i vaccini possono, anche se in casi estremamente rari, provocare reazioni allergiche gravi (shock anafilattico) che insorgono quasi immediatamente dopo la somministrazione del vaccino; per questo è **necessario attendere 15 – 30 minuti, prima di allontanarsi dall'ambulatorio.**