

Specifiche per la realizzazione della campagna di vaccinazione contro il meningococco C di cui alla DGR 571 del 27/4/2015

Offerta vaccino quadrivalente coniugato ACW135 Y

aggiornamento 15 maggio 2015

Per la campagna di vaccinazione antimeningococco C sono previste due azioni specifiche

A) Età : dagli 11 anni compiuti al compimento dei 20 anni

- 1) la verifica dello stato vaccinale e il recupero degli adolescenti non vaccinati nell'infanzia offrendo attivamente e gratuitamente il quadrivalente coniugato ACWY
- 2) l'offerta gratuita di una dose di richiamo con lo stesso vaccino quadrivalente ACWY a coloro che erano già stati vaccinati nell'infanzia con una dose di vaccino antimeningococco C monovalente o quadrivalente ACWY

B) Età : dai 20 anni compiuti al compimento dei 45 anni. A richiesta ,per tutto l'anno 2015, una dose di vaccino quadrivalente coniugato ACWY nelle Aziende USL in cui si è verificato un caso di meningite del ceppo C (alla data del 14 maggio, le aziende USL 2,3,4,5,8,10,11)

Categoria	Tipo di vaccinazione offerta
Bambini di età inferiore a 11 anni mai vaccinati per Meningococco C	Tutti i soggetti mantengono il diritto alla vaccinazione con meningococco C offerta gratuitamente con vaccino monovalente.
Bambini di età inferiore a 11 anni già vaccinati per Meningococco C	In questa fascia di età non sono previsti richiami. In caso di richiesta specifica, la vaccinazione è soggetta al pagamento della compartecipazione al costo, secondo il tariffario regionale vigente.
Ragazzi nella fascia di età 11-20 non precedentemente vaccinati per Meningococco C	Vaccino quadrivalente coniugato ACWY. In caso di richiesta del solo vaccino Meningococco C, è possibile farlo (documentare su scheda consenso).
Ragazzi nella fascia di età 11-20 precedentemente vaccinati per Meningococco C con vaccino monovalente	Prevista una dose di richiamo con vaccino quadrivalente coniugato ACWY a qualsiasi distanza di tempo dal precedente meningococco C, in genere 5 anni. In caso di richiesta del solo vaccino Meningococco C, è possibile farlo (documentare su scheda consenso).

<p>Ragazzi nella fascia di età 11-20 precedentemente vaccinati per Meningococco C con vaccino quadrivalente (coniugato)</p>	<p>Prevista una dose di richiamo con vaccino quadrivalente coniugato ACWY. Se la dose è stata effettuata prima degli 11 anni (richiamo dopo 5 anni dalla precedente e comunque non prima di 1 anno). Se la dose di quadrivalente coniugato ACWY è stata effettuata dopo 11 anni il soggetto è da considerarsi protetto.</p>
<p>Ragazzi nella fascia di età 11-20 precedentemente vaccinati con vaccino polisaccaridico (Mencevax o altro)</p>	<p>La durata della protezione del vaccino polisaccaridico (Mencevax o altro) è di circa 3 anni. Si consiglia quindi la dose di vaccino quadrivalente coniugato ACWY dopo 3 anni.</p>
<p>Adulti nella fascia di età 20-45 vaccinati con vaccino polisaccaridico non coniugato (Mencevax o altro)</p>	<p>La durata della protezione del vaccino polisaccaridico (Mencevax o altro) è di circa 3 anni. Si consiglia quindi la dose di vaccino quadrivalente coniugato ACWY dopo 3 anni. Durante il servizio militare, fino a tutto il 2012 veniva somministrato il vaccino quadrivalente polisaccaridico non coniugato (Mencevax o altro); dal 2013 viene effettuato il coniugato quadrivalente. Per l'anno 2015 è prevista, a richiesta una dose gratuita di vaccino quadrivalente ACWY nelle Aziende USL in cui si è verificato un caso di meningite del ceppo C (alla data del 14 maggio, le aziende USL 2,3,4,5,8,10,11).</p>
<p>Adulti nella fascia di età 20-45 anni non precedentemente vaccinati per Meningococco C</p>	<p>Per l'anno 2015 è prevista, a richiesta, una dose gratuita di vaccino quadrivalente coniugato ACWY nelle Aziende USL in cui si è verificato un caso di meningite del ceppo C (alla data del 14 maggio, le aziende USL 2,3,4,5,8,10,11).</p>
<p>Soggetti di età superiore ai 45 anni</p>	<p>Non prevista vaccinazione all'interno della campagna. Qualora la persona lo richieda, e compatibilmente con la disponibilità di vaccini e di personale , è soggetta al pagamento della compartecipazione al costo secondo il tariffario regionale vigente.</p>

<p>Soggetti con Patologie a rischio (vedi paragrafo 2.3.8 DGR 571/2015)</p>	<p>Offerta gratuita di vaccino quadrivalente coniugato ACWY ai soggetti di qualsiasi età affetti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) talassemia e anemia falciforme b) asplenia post-traumatica c) altre cause di asplenia d) condizioni associate a immunodepressione (come trapianto d'organo o terapia antineoplastica, compresa la terapia sistemica corticosteroidea ad alte dosi) e) diabete mellito tipo 1 f) malattie polmonari croniche g) insufficienza renale cronica con creatinina clearance <30 ml/min h) alcoolismo cronico i) infezione da HIV j) immunodeficienze congenite k) malattie epatiche croniche gravi l) perdita di liquido cerebrospinale m) difetti congeniti delle frazioni terminali del complemento (C5 – C9) n) difetti dei toll like receptors di tipo 4 o) difetti della properdina p) altre patologie con difetto dell'immunità innata q) trapiantati o candidati al trapianto r) riceventi fattori della coagulazione concentrati
------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI

- 1) In generale si effettua la vaccinazione richiesta a meno che non sia passato meno di un anno da una precedente dose di vaccino quadrivalente coniugato ACWY.
- 2) Se si presenta un soggetto che ha già effettuato il vaccino quadrivalente ACWY coniugato dopo l'undicesimo anno è da considerarsi protetto dato che il vaccino è disponibile in Italia dal 2010.
- 3) Se si presenta un soggetto che ha già effettuato il vaccino quadrivalente ACWY coniugato prima dell'undicesimo anno si offre una ulteriore dose di vaccino coniugato se sono trascorsi 5 anni.
- 4) Se il soggetto ha fatto in precedenza una dose di meningococco B, è opportuno rispettare un intervallo di tempo di almeno 2 settimane per monitorare in modo corretto gli eventi avversi.